

ไข้เลือดออก

ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต

อาการ

ไข้สูงลอยเกิน 2 วัน
มีผื่น จุดแดงขึ้นตามลำตัว
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้
อาเจียน เบื่ออาหาร

หากมีอาการดังนี้ควรรีบไปพบแพทย์



คำเตือน!



อย่าซื้อยากินเอง

โดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs
เช่น ยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน
หรือ ไดโคลฟีแนค



การป้องกัน



เก็บบ้าน

ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก



เก็บขยะ

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่

หน้าจั่วร้าย ปะทะ ยุงตัวแสบ



ช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลของหน้าจั่วจริง ๆ มองไปทางไหนก็เจอ ตั้งแต่ หน้าฝน หน้าป่า จนไปถึง หน้าท่อม แต่ยังมีอีกหน้าที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นก็คือ **หน้าจ้ง** ซึ่งหน้าจ้งถือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชั้นดีเลยที่เดียวโดย เจ้ายุงลายมักชอบวางไข่ที่ไหน ใครรู้บ้าง?...เฉลย



น้ำนิ่งใส



น้ำเน่าเสีย



แหล่งเพาะพันธุ์

วิธีการกำจัด



ยางรถยนต์เก่า

ปิดฝาภาชนะให้สนิท



โอ่งน้ำ

เปลี่ยนน้ำใน



ภาชนะที่ปิดไม่ได้



กองขยะ

เทน้ำที่จ้ง



ทิ้งเสมอ



แจกัน

จัดขอบภาชนะ หลังเทน้ำทิ้ง



กะลามะพร้าว

ทำเป็นประจำทุก 7 วัน



หมั่นทำเป็นประจำ เจ้ายุงลายไม่มารบกวนแน่นอน





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ตักออก

ทุก 7 วัน

โอ่งน้ำ หรือภาชนะน้ำใช้ในบ้าน
ใช้กระชอนตักลูกน้ำทิ้ง
เพื่อป้องกันการเกิดยุงลาย
และป้องกันโรคที่มียุงลาย
เป็นพาหะนำโรค

รู้ทัน โรคแมลง





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ตัดขอบถัง

ป้องกันยุงเกิด



รู้ทัน โรคแมลง

ไข่ยุงในขอบถัง สามารถอยู่ได้
นานเป็นปี ถึงแม้จะไม่มีน้ำ
นอกจากเปลี่ยนน้ำทุก 7 วันแล้ว
อย่าลืมตัดขอบถังด้วยนะ

ปล่อย



กินลูกน้ำยุงลาย



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

อ่างบัว อ่างไม้ น้ำ ปล่อยทิ้งไว้ ยุงลาย อาจ มาวางไข่ ได้
ป้องกัน ด้วยการ ปล่อย ปลา กิน ลูกน้ำ ยุง เช่น
ปลาหางนกยูง ปลา กัด หรือ ปลา สอด



รู้ทัน โรคแมลง