

# ไข้เลือดออก

## ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต

### อาการ

ไข้สูงลอยเกิน 2 วัน  
มีผื่น จุดแดงขึ้นตามลำตัว  
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย  
ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้  
อาเจียน เบื่ออาหาร

หากมีอาการดังนี้ควรรีบไปพบแพทย์



คำเตือน!



\*\*\*อย่าซื้อยากินเอง\*\*\*

โดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs  
เช่น ยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน  
หรือ ไดโคลฟีแนค



### การป้องกัน



เก็บบ้าน

ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก



เก็บขยะ

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่

# ไข้อยู่แล้ว ออก

"เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะ"

## อาการ



ไข้สูง  
เฉียบพลัน



หน้าแดง  
มีผื่น



คลื่นไส้  
อาเจียน  
เมื่ออาหาร



อ่อนเพลีย  
ปวดกล้ามเนื้อ



เลือดกำเดาไหล



เลือดออก  
ตามไรฟัน



อาเจียน  
เป็นเลือด



ถ่าย  
เป็นเลือด



## 4 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง จากไข้อยู่แล้ว



เด็กที่มีอายุ  
ต่ำกว่า 5 ปี



ผู้สูงอายุ



ผู้ที่มี  
โรคประจำตัว



ผู้ที่มี  
ภาวะอ้วน