

ร่วมกัน ป้องกัน ไข้เลือดออก

เริ่มต้นที่บ้านเรา

ปลอดลูกน้ำ | ปลอดยุงลาย | ปลอดภัยทุกคน



โรคไข้เลือดออก

เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี
มียุงลายเป็นพาหะ
มักป่วยบ่อยในช่วงฤดูฝน



+ อาการสำคัญ

1



ไข้สูงลอย
39-40 องศาเซลเซียส
นาน 2-7 วัน

2




ปวดศีรษะ ปวดตา
ปวดเมื่อยตามตัว
กล้ามเนื้อหรือกระดูก

3



เบื่ออาหาร
คลื่นไส้
หรืออาเจียน

4



มีผื่นหรือจุดเลือดออก
ตามตัว




การดูแลรักษาและการป้องกัน



ห้าม!

ซื้อยาแอสไพริน
หรือไอบูโพรเฟน
กินเอง



ให้ใช้ยาพาราเซตามอล
ตามแพทย์สั่ง
และเช็ดตัวลดไข้



รีบพบแพทย์ทันที

หากมีอาการซึม
ปวดท้องรุนแรง
หรือถ่ายเป็นเลือด



ป้องกันยุงกัด



ทายากันยุง



นอนในมุ้ง



กำจัดแหล่งน้ำขัง
รอบบ้าน

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

ไข้เลือดออก / ไข้ชิก้า / ไข้ปวดข้อยุงลาย



1

เก็บบ้าน



ให้ปลอดโปร่ง
ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

2

เก็บขยะ



เก็บขยะ เศษภาชนะ
ไม่ให้成为แหล่งน้ำขัง

3

เก็บน้ำ



ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายวางไข่



กำจัดยุงลายทุกสัปดาห์

เพื่อครอบครัวปลอดภัย ไร้ไข้เลือดออก



โดย เทศบาลตำบลป่าแฝก
โทร **054-426238** ต่อ 101



เทศบาลตำบลป่าแฝก



www.phafaek.go.th